



Stand: Juni 2022. Bilder: ©Bergmannsheil Buer



**Terminvereinbarung**  
**Spezialsprechstunde für Kraniosynostosen**  
 Tel. 0209 369-602

**Arzt-Kontakt zum kinderneurochirurgischen**  
**Oberarzt in dringenden Fällen:**  
 Tel. 0209 5902-7898



**Klinik für Pädiatrische Neurochirurgie**  
 Chefarzt Dr. med. Lutz Schreiber  
 Adenauerallee 30  
 45894 Gelsenkirchen

Tel. 0209 369-601  
 Fax 0209 369-610

E-Mail:  
[kinderneurochirurgie@bergmannsheil-buer.de](mailto:kinderneurochirurgie@bergmannsheil-buer.de)  
[www.kjkge.de](http://www.kjkge.de)



# Kraniosynostosen

## Klinik für Pädiatrische Neurochirurgie



Dr. med. Lutz Schreiber  
Chefarzt  
Klinik für Pädiatrische Neurochirurgie

## Sehr geehrte Eltern,

unsere kinderneurochirurgische Klinik behandelt alle Krankheitsbilder, die den Kopf und den Rücken Ihres Kindes betreffen. Von Geburt an bis zum 18. Lebensjahr sind wir für Sie und Ihr Kind da.

Ein spezieller Schwerpunkt ist die Abklärung von Schädelverformungen sowie die endoskopische Behandlung von sogenannten frühzeitigen Schädelnahtverknöcherungen (Kraniosynostosen). Es handelt sich bei der Kraniosynostose um eine Erkrankung, die zwar einen operativen Eingriff erforderlich macht, mittlerweile aber über das endoskopische Verfahren schonend behandelt werden kann. Hierbei wird eine zu früh verknöcherte Naht des Schädelknochens Ihres Kindes kameragestützt mittels Schlüsselochtechnik wieder eröffnet.

Somit kann das Kopfwachstum Ihres Kindes wieder normal voranschreiten, ohne durch die vorzeitige Verknöcherung der Schädelnaht beeinträchtigt zu werden.


Verformungen des Kopfes Ihres Babys können auf eine solche vorzeitige Verknöcherung hinweisen.

Typisch sind

▶ lange, schmale Kopfform (Verknöcherung der Sagittalnaht)




▶ Verformungen der Augenhöhlen und asymmetrische Gesichtszüge (Verknöcherung der Coronarnaht)



▶ schmale Stirn und geringe Gesichtsbreite (Verknöcherung der Frontalnaht)



▶ verformte Hinterköpfe und schiefstehende Ohren (Verknöcherung der Lambdanaht)



Sollte der Verdacht auf eine vorzeitige Verknöcherung von Schädelnähten bei Ihrem Kind bestehen, ist eine Abklärung mit einer Ultraschalluntersuchung in unserer Klinik innerhalb von maximal sieben Tagen möglich und sollte vereinbart werden.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit herzlichem Gruß

**Dr. med. Lutz Schreiber**  
Chefarzt  
Klinik für Pädiatrische Neurochirurgie