


Ihr schnellster Weg zu uns

Knappschaftsklinikum Saar, Krankenhaus Sulzbach
An der Klinik 10, 66280 Sulzbach



Bahn: Mit dem ICE von Karlsruhe in Richtung Paris mit Umsteigen in Saarbrücken Hbf. Von dort aus Direktverbindung nach Sulzbach Bahnhof mit direkten Verbindungen aus/nach Saarbrücken/Trier sowie Neunkirchen/Kaiserslautern.

Bus: Bitte wählen Sie die Saartallinien 103, 104 aus Richtung Friedrichsthal und Spiesen-Elversberg sowie aus Klarenthal über Saarbrücken (Haltestellen: Johanneskirche/Rathaus) kommend.

PKW: Über die A8 aus Richtung Neunkirchen oder Saarlouis kommend: Am Autobahndreieck Friedrichsthal wechseln Sie auf die A 623, an der Abfahrt 3 (Sulzbach, Quierschied) fahren Sie ab und folgen der Ausschilderung Sulzbach. Aus Saarbrücken über die A 623 kommend wählen Sie die Abfahrt 3 (Sulzbach, Quierschied) und folgen der Beschilderung Sulzbach.

Flugzeug: Vom Flughafen Saarbrücken-Ensheim (www.flughafen-saarbruecken.de) erreichen Sie die Klinik mit dem PKW in 16 Minuten: Der Balthasar-Goldstein-Straße folgen Sie bis zur L108 (500 m) und fahren auf der L126 bis „An der Klinik“ in Sulzbach/Saar weiter (13,8 km). Mit der Buslinie R 10 erreichen Sie den Hauptbahnhof Saarbrücken (27 Minuten) und nehmen danach die Regionalbahn bis Bahnhof Sulzbach. Alternativ stehen Taxis oder der Airport Shuttle Transfer bereit. Fahrplanauskunft: www.saarfahrplan.de



Patienteninformation

Hochansteckende virusbedingte Bindehautentzündung

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

bei Ihnen wurde eine **hochansteckende virusbedingte Bindehautentzündung** oder der Verdacht darauf festgestellt.

Die beste Vorbeugung besteht in der Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen, da die Übertragung vor allem durch Schmier- bzw. Kontaktinfektionen innerhalb der Familie oder unter Arbeitskollegen stattfindet.

Die Hände sollten häufig gewaschen werden, besonders nach Augenkontakt. Händeschütteln sowie der Gebrauch gemeinsamer Handtücher und Hygieneartikel sollte vermieden werden. Beachten Sie, dass handelsübliche Desinfektionsmittel in diesem Falle nicht immer wirksam sind.

Erkrankte Kinder müssen von anderen ferngehalten werden, bis der Augenarzt den Kindergarten- bzw. Schulbesuch wieder erlaubt.

Ebenso sollten Sie bei jedem Arztbesuch (Hausarzt / Facharzt / Klinikeinweisung) direkt an der Anmeldung über die Ansteckungsgefahr informieren. Öffentliche Einrichtungen sollten unbedingt gemieden werden. Bitte beachten Sie, dass die Symptome einer Bindehautentzündung von Patient zu Patient unterschiedlich sein können. Typische Zeichen können sein:



- Fremdkörpergefühl im Auge
- hochrote Augen
- Schmerzen
- Bindehautschwellung
- Lichtempfindlichkeit
- Tränenträufeln
- Lichtscheue
- vorübergehende Sehschwäche

Wichtig ist die Einhaltung der genannten Hygieneempfehlungen sowie die Beachtung der Anweisungen Ihres Augenarztes.

Die verordneten Augentropfen müssen regelmäßig verabreicht werden und dürfen auf keinen Fall von mehreren Personen verwendet werden. Bitte waschen Sie sich vor und nach dem Verabreichen der Augentropfen die Hände. Dies gilt auch für Personen, die Ihnen ggf. die Tropfen verabreichen.

Sollten Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht uns bzw. einen Augenarzt Ihres Vertrauens anzusprechen.

Gute Besserung wünscht

das Team der Augenkl. Sulzbach